

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 8-7-81819447

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE
CPPAP N° 523 AD

EDITION DE LA STATION « ALSACE ET LORRAINE »

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. (88) 61 49 50 Poste 457

ABONNEMENT ANNUEL: 70 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, rue des Mineurs

67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 5.508.00 F

Bulletin n° 19

7 juillet 1981

ARBRES FRUITIERS

- POMMIER - POIRIER -

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Perturbé par les fortes variations des températures enregistrées au cours du mois de juin, le vol des papillons de la première génération se poursuit. Les captures en pièges sexuels sont particulièrement importantes dans la région de WISSEMBOURG.

En toutes régions, le renouvellement du traitement est conseillé dès réception du présent bulletin.

CULTURES MARAICHERES

Maintenir la protection des cultures de tomates contre le mildiou ainsi que des cultures de céleris contre la septoriose.

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Les toutes premières captures sont enregistrées en pièges sexuels depuis les premiers jours de juillet. Cependant aucun oeuf n'est pour l'instant observé sur les grappes. Il est donc absolument inutile, pour l'instant, d'effectuer un traitement insecticide.

BRENNER

Des attaques importantes de Brenner sont localement observées dans de nombreux secteurs du vignoble (BARR, DAMBACH-LA-VILLE, KINTZHEIM, ST-HIPPOLYTE, WESTHALTEN, HATTSTATT ...).

Elles débutent par des jaunissements en tache au centre du limbe, puis gagnent toute une partie des feuilles qui dessèchent par la suite entre deux nervures.

La lutte contre cette maladie étant préventive, toute intervention actuelle serait inutile.

Par contre, deux applications spécifiques, au printemps prochain, avec des produits à base de mancozèbe, l'une au stade trois feuilles étalées, l'autre au stade six feuilles, éviteront que ces dégâts se répètent dans ces secteurs.

ARAIGNEES JAUNES

Des pullulations "d'araignées jaunes", provoquant le vieillissement prématuré du feuillage, sont observées dans certains secteurs, et tout particulièrement au sud de ROUFFACH.

Les feuilles prennent une teinte bronzée caractéristique, la face inférieure étant colonisée par des minuscules érycophytes jaunes.

Actuellement, ces "araignées" sont sous les trois formes : oeufs, larves et adultes.

Aussi, si dans ces situations un traitement spécifique de rattrapage est envisagé pour préserver le feuillage, on veillera à choisir un acaricide actif sur toutes les formes.

En cas de faible attaque, on attendra un avis ultérieur pour décider d'un éventuel traitement.

GRANDES CULTURES

- MAIS -

PYRALE DU MAIS

Le vol s'est intensifié ces derniers jours et les premières pontes sont maintenant écloses.

Dans les secteurs chauds de la plaine les panicules mâles sont visibles.

Les traitements insecticides avec des formulations microgranulées pourront débuter dès le stade 50 % de panicules mâles visibles dans le cornet.

Pour de plus amples informations concernant :

- le choix des produits,
- les seuils de traitements conseillés,

consulter notre bulletin n° 18 du 2 juillet.

- TABAC -

MILDIU

La fédération des planteurs de tabac d'Alsace communique :

Le mildiou du tabac est à notre porte.

En effet, la première apparition du mildiou en 1981 vient d'être signalée en Palatinat, dans la commune de BERG, sur les variétés Geudertheimer et Burley.

L'attention des planteurs d'Alsace, qui sont les plus voisins de la zone atteinte, est tout spécialement attirée sur les dangers encourus par les cultures de tabac.

Il convient d'éviter dans toute la mesure du possible - ou tout au moins de retarder au maximum - les premières manifestations du mildiou.

A cet effet, toutes les mesures préventives doivent être appliquées par TOUS les planteurs.

Les principales sont rappelées ci-après :

- destruction immédiate des semis qui ne le seraient pas encore ;
- poursuite des traitements fongicides dans les conditions indiquées par le Service Technique ;

- surveillance attentive des parcelles;
- dès apparition d'une tache suspecte, alerte immédiate du Chef de Secteur, ou du Délégué qui l'avertira lui-même sans délai.

REPONDEURS TELEPHONIQUES

- Alsace : (88) 60.30.10 (conseils céréales, colza, maïs, vigne)
- Lorraine : (8) 337.45.98 (conseils céréales, colza, arbres fruitiers),
- répondeur téléphonique de la Météorologie de MEYENHEIM : (89) 81.04.47
(spécial vigne Haut-Rhin)

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"

J. HARRANGER

P 310